

水稲



デゾレート®

AZ粒剤

®は登録商標

水稲刈取跡の除草に!


刈取跡に



デゾレート
処理区

↑
デゾレート
無処理区

幅広い水田
雑草に有効!



雑草名

- アシカキ ● イボクサ
- キュウリグサ
- スズメノテッポウ など

■ 購入時に印鑑が必要です

テフレート AZ粒剤

有効成分:塩素酸ナトリウム50%

※この他に **テフレート A**(水溶剤)
テフレート AZ粉剤もあります。

水稲刈取跡の除草に!

特長

- 幅広い水田雑草に効果があり、特にアシカキ・スズメノテッポウ等に効果があります。
- 駐車場、宅地などでも使用でき、タケ・ササ等の侵入箇所にも有効です。
- 散布後2~3ヶ月で種まきや定植ができます。

■ 適用作物・雑草と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	塩素酸塩を含む農薬の総使用回数
水稲 (水稲刈取跡)	一年生雑草 多年生イネ科雑草	水稲刈取後 (秋期雑草生育期)	全土壌	20~25 kg/10a	1回	水稲刈取跡に 全面土壌散布	東北以南	—

作物名	適用場所	適用雑草木名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	塩素酸塩を含む農薬の総使用回数
開墾後に栽培する農作物等	開墾地	一年生及び 多年生雑草 雑かん木 ササ類 ススキ	雑草生育期 (積雪時及び 土壌凍結時を 除く)	15~25kg/10a	2回以内	全面均一散布	3回以内
すぎ、ひのき まつ、からまつ えぞまつ とどまつ ぶな、かんば	地ごしらえ					空中散布	
	下刈り	全面均一散布					
空中散布							
すぎ、ひのき まつ、からまつ えぞまつ、とどまつ	地ごしらえ 又は下刈り	ススキ	雑草生育期 (草丈20cm以下)	30g/株径20cm 60g/株径30cm 85g/株径40cm	1回	株処理	
樹木等	公園、堤とう 駐車場、道路 運動場、宅地 のり面等	一年生及び 多年生雑草	雑草生育初期 ~中期	15~25kg/10a	3回以内	植栽地を除く 樹木等の周辺地に 雑草茎葉散布	3回以内 (全面土壌散布 は1回以内、 但し当該処理 をする場合には 雑草茎葉散布 は1回以内)
		竹類	生育期	45~60kg/10a	1回	植栽地を除く 樹木等の周辺地に 全面土壌散布	

■ 毒性 人畜毒性:医薬用外劇物 急性経口 ラット>5,000mg/kg(製剤)

■ 包装単位 1ケース:5kg×4袋

▲ 使用上の注意事項

- 本剤は従来品に比べて難燃性に製剤してありますが、散布前後には散布機をよく清掃して油や汚れを拭き取って下さい。
- 散布時に本剤が、身体や作業衣に付着の少ないよう風向等に注意し、散布したところを歩かないでください。
- 本剤のしみこんだ作業衣は、火気に対して燃えにくくなっていますが、作業後水洗いしてください。
- 水源池、飲料水等に飛散・流入しないように十分注意してください。
- 散布器具、容器の洗浄水は河川等に流さず、容器、空袋等は環境に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 植栽地を除く樹木等の周辺地で使用する場合は、薬剤が樹木等の植栽地に流入または飛散するおそれのある場所等では使用しないでください。また、樹木等有用植物の根が分布していると思われるところでは使用を避けてください。
- 医薬用外劇物。取扱いには十分注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 使用の際は農業用マスク、手袋、長ズボン、長袖の作業衣などを使用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗顔してください。
- 公園、堤とう等で使用する場合は、使用中及び使用後(少なくとも使用当日)に小児や使用に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- 本剤は家畜が好んで食べて中毒を起こすことがあるので保管に注意し、また使用直後の使用区域への家畜の放飼は行わないでください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。●容器、空袋などは圃場などに放置せず、適切に処理してください。●防除日誌を記帳しましょう。

この印刷物は平成25年8月現在の登録内容に基づき作成しました。

 **日本カーリット株式会社**

東京都中央区京橋1丁目17番10号




竹に効果あり!!

竹の拡大抑止に最適

テゾレート® AZ粒剤

竹には春処理・秋処理が最適!!
(3~5月) (10~12月)

処理・伐採した土地の有効活用に
ソーラーパネルを設置!!



竹に効果あり!!

特徴

- ➡ 幅広い雑草に効果があり、特にササ・ススキ・ヨモギ等に効果があります。
- ➡ 駐車場、宅地などでも使用でき、タケ、ササ等の侵入箇所にも有効です。また、根まで枯らし翌年の再生を抑えます。

📄 適用作物・雑草と使用方法

作物名	適用品所	適用雑草木名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	塩素酸塩を含む農薬の総使用回数
樹木等	公園、堤とう、 駐車場、道路、 運動場、宅地、 のり面等	一年生及び 多年生雑草	雑草生育 初期～中期	15～25kg/10a	3回以内	植栽地を除く 樹木等の周辺地に 雑草茎葉散布	3回以内 (全面土壌散布は 1回以内、但し当 該処理をする場合 には雑草茎葉散 布は1回以内)
		竹類	生育期	45～60kg/10a	1回	植栽地を除く 樹木等の周辺地に 全面土壌散布	

毒性

人畜毒性：医薬用外劇物 急性経口 ラット>5,000mg/kg(製剤)

包装単位

1ケース：5kg×4袋

❗ 使用上の注意事項

- 本剤は従来品に比べて難燃性に製剤してありますが、散布前後には散布機をよく清掃して油や汚れを拭き取って下さい。
- 散布後に本剤が、身体や作業衣に付着の少ないよう風向等に注意し、散布した所を歩かないで下さい。
- 本剤の染み込んだ作業衣は、火気に対して燃えにくくなっていますが、作業後水洗いして下さい。
- 水源地、飲料水等に飛散・流入しない様に十分注意して下さい。
- 散布器具、容器の洗浄水は河川等に流さず、容器、空袋等は環境に影響を与えない様適切に処理して下さい。
- 植栽地を除く樹木等の周辺地で使用する場合は、薬剤が樹木等の植栽地に流入または飛散するおそれの有る場所等では使用しないで下さい。また、樹木等有用植物の根が分布していると思われる所では使用を避けて下さい。
- 医薬用外劇物。取扱いには十分注意して下さい。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせて下さい。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当てを受けて下さい。
- 使用の際は農業用マスク、手袋、長ズボン、長袖の作業衣などを使用して下さい。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼して下さい。
- 公園、堤とう等で使用する場合は使用中及び使用後(少なくとも使用当日)に小児や使用に関係の無い者が使用区域に立ち入らない様縄囲いや立て札を立てる等配慮し、人畜等に被害を及ぼさない様注意を払ってください。
- 本剤は家畜が好んで食べて中毒を起こす事があるので保管に注意し、また使用直後の使用区域への家畜の放飼は行わないで下さい。

●使用前にはラベルをよく読んで下さい。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。
●容器・空袋などは圃場などに放置せず、適切に処理して下さい。 ●防除日誌を記帳しましょう。