

オルトラン®粒剤 の登録内容変更についてのご案内

(農林水産省登録第 19993 号)

日本では、農薬の安全性を一層担保するために、今年から急性暴露評価が導入されることになりました。この評価にあたり、オルトラン粒剤・水和剤は自主的に登録縮小の申請を致しました。これは、現在登録されている使用方法で想定される最大の農薬残留が認められる作物を、たとえ通常より非常に多く1日に摂取した場合でも、健康に影響を与えないようにするためのです。このため、生産者の皆さまにおかれましては、以下の新しい登録予定内容にてご使用いただきますようお願いいたします。

●農薬登録の削除作物について

下記、登録削除作物でのオルトラン粒剤の使用をしないようお願いいたします。

オルトラン粒剤

作物名
ミニトマト
はつかだいこん

●使用方法の変更作物について

オルトラン粒剤は、表①の農薬登録申請内容のとおり農薬登録の縮小申請をしました。**今後は、表①のとおり農薬登録されている使用方法の変更申請内容においてご使用願います。**但し、申請内容は今後変更になる可能性がありますのでご了承ください。使用上の注意事項などについては、製品ラベルをご参照ください。

【表① オルトラン粒剤 平成 26 年 7 月 1 日 使用方法変更 申請内容 (負の変更部分のみ)】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	7FEETを含む農薬の総使用回数
キャベツ	アオムシ、コガ ヨトウムシ アブラムシ類	3~6kg/10a (1~2g/株)	定植時	1回	植穴処理	2回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後は1回以内)
	アブラムシ類	6g/m ²	育苗期	1回	散布	
トマト	アブラムシ類 オジジコナジミ					
	アブラムシ類 アザミアザ類 オジジコナジミ	3~6kg/10a (1~2g/株)			作条散布 又は 植穴処理	
ピーマン	アブラムシ類	2g/株	定植時	1回	株元散布	1回
はくさい	アオムシ、コガ ヨトウムシ アブラムシ類	3~6kg/10a (1~2g/株)			植穴処理	
	アブラムシ類	6kg/10a (2g/株)			株元散布	
ブロッコリー	ヨトウムシ				株元散布	
だいこん	アオムシ、コガ アブラムシ類	3~4kg/10a	は種前		作条散布	
		4kg/10a	収穫21日前 まで	1回	株元散布	1回
かぶ						
ばれいしよ	アブラムシ類	3~6kg/10a (1~2g/株)	植付時		作条散布	3回以内 (植付時の処理は1回以内、植付後は2回以内)

裏面もご覧ください。

オルトラン®水和剤 (農林水産省登録第 19992 号)

登録内容変更についてのお願い

日本では、農薬の安全性を一層担保するために、今年から急性暴露評価が導入されることになりました。この評価にあたり、オルトラン水和剤・粒剤は自主的に登録縮小の申請を致しました。これは、現在登録されている使用方法で想定される最大の農薬残留が認められる作物を、たとえ通常より非常に多く1日に摂取した場合でも、健康に影響を与えないようにするためのです。このため、生産者の皆さまにおかれましては、以下の新しい登録予定内容にてご使用いただきますようお願いいたします。

●農薬登録の削除作物について

下記、登録削除作物でのオルトラン水和剤の使用をしないようお願いいたします。

オルトラン水和剤

作物名
かんきつ
トマト
ミニトマト
ブロッコリー
なす
かぶ
はつかだいこん

その他、「たかな」が非結球あぶらな科葉菜類から作物削除、「とうもろこし」が「未成熟とうもろこし」に変更されます。

●使用方法の変更作物について

オルトラン水和剤は、表②の農薬登録申請内容のとおり農薬登録の縮小申請をしました。

今後は、表②のとおり農薬登録されている使用方法の変更申請内容においてご使用願います。但し、申請内容は今後変更になる可能性がありますのでご了承ください。

☞ 使用上の注意事項などについては、製品ラベルをご参照ください。

【表② オルトラン水和剤 平成 26 年 7 月 1 日 使用方法変更 申請内容 (負の変更部分のみ)】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数(倍)	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゼフェートを含む農薬の総使用回数
キャベツ	ヨウムシ、ハスモンヨウ タナキ、アワバ	1000~1500	収穫30日 前まで	1回	散布	2回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後は1回以内)
	アラムシ、コガ、アラムシ類	1000~2000				
	カラムシ、ヨウムシ、ハスモンヨウ	1,500				
はくさい	アラムシ、コガ、アラムシ類	1500~2000	収穫21日 前まで	1回	散布	1回
	ヨウムシ	1000~1500				
レタス	オオカ、コガ	1,000	3回以内	3回以内	散布	3回以内
だいこん	ヨウムシ、カラムシ、ダイコンクイムシ	1,500	収穫21日 前まで	1回	散布	1回
	アラムシ、コガ、アラムシ類	1500~2000				
非結球あぶらな科葉菜類 (ケールからしな、みずな、ルッコラ、たかなを除く)	アラムシ類	1,500	収穫21日 前まで	1回	散布	1回
	アラムシ、コガ、アラムシ類	1500~2000				
	アラムシ	1,000				
はれいしよ	アラムシ類	1,000	収穫30日 前まで	2回以内	10a当り 250散布	3回以内 (植付時の処理は1回以内、植付後は2回以内)
	アラムシ類、ジャガイモ	300				
	アラムシ類	1000~1500				
未成熟 とうもろこし	アラムシ類	1,000	収穫7日 前まで	2回以内	散布	2回以内
	アラムシ類	1,000				
ぶどう	チャノキ/アザミガ フ好北アコハイ	1500~2000	収穫60日 前まで	1回	散布	1回
	ハマキムシ類	1,500				
かき	アザミガ、アザミガ アザミガ	1,500	収穫45日 前まで	2回以内	散布	2回以内
	アザミガ	1,500				
茶	チャノキ/アザミガ チャノキ/アコハイ	1000~2000	摘採45日 前まで	1回	散布	1回
	チャノキ/アコハイ	1000~1500				

裏面もご覧ください。